



Voorbeeld handleiding “Quarantainestal”

Doelgroep:

- Verantwoordelijke varkensbedrijf
- Leverancier van dieren

Doel:

Beperken van ziekte-insleep door aangevoerde dieren enige tijd in de quarantainestal te houden en ze tijd te geven om aan de kiemen op het bedrijf te laten wennen.

Benodigde materialen:

- Quarantainestal
- Bedrijfseigen materialen
- Bezoekersregister quarantainestal
- Schoonmaak- en ontsmettingsmaterialen
- Handleiding Klimaat

Eisen quarantainestal:

- De quarantainestal ligt meer dan 300 m van de andere bedrijven.
- De quarantainestal is goed gescheiden van de andere stallen qua klimaat en ventilatie.
- Het betreden van de quarantainestal kan alleen via de hygiënesluis.
- In de quarantainestal zijn eigen materialen aanwezig.
- De quarantaineperiode voor nieuw aangevoerde dieren is minimaal 6 weken, maar bij een onbekende Mycoplasma status is dit minimaal 8 weken.
- In de quarantainestal wordt gewerkt met een strikt all in – all out systeem.

Uitvoering:

- Ieder persoon die de quarantainestal betreedt registreert zich in het bezoekersregister.
- Altijd handen wassen en omkleden voor het betreden en bij het verlaten van de quarantainestal.
- Reinig en desinfecteer de quarantainestal (bij voorkeur 2x) voordat de nieuwe varkens erin worden geplaatst.
- Laat de quarantainestal na reiniging en desinfectie goed opdrogen, voordat nieuw aangevoerde varkens erin worden geplaatst.
- Verzorg de varkens in de quarantainestal aan het eind van de dag.
- Laat hoestende dieren/ dieren met gezondheidsproblemen euthanaseren en bied ze ter sectie aan bij de GD.
- Houd hokkaarten en het zeugenmanagementsysteem goed bij. Hiermee kunnen eventuele gezondheidsproblemen vroegtijdig worden gesignaleerd en het kan helpen de oorzaak ervan te achterhalen.
- Monitor de aangevoerde varkens op aanwezigheid van bepaalde ziektekiemen (vul de specifieke kiemen in), voordat ze worden overgeplaatst van de quarantainestal naar de echte stal op het bedrijf.
- Laat het klimaat minimaal eenmaal per jaar controleren en de regelapparatuur iken door een specialist (zie Handleiding Klimaat).

Achtergrond

Aanvoer van dieren vormt een groot risico op insleep van ziektekiemen. Aanvoer van dieren mag alleen mits deze van een bedrijf met een gecontroleerde gelijke of hogere status komen. Nieuw aan te voeren dieren komen bij voorkeur van hetzelfde herkomstbedrijf als de eerder aangevoerde dieren. Dit aangezien onbekend is welke 'minor'pathogenen zich in een varken van een bepaald bedrijf ophouden. Inzicht in de gezondheidstatus van het leverende bedrijf en de methode waarop deze status gecontroleerd wordt (klinische gegevens, bloed- en/of mestonderzoek), is gewenst. Bij aanvoer van dieren moeten deze in quarantaine voor minimaal 6 weken. Als de Mycoplasma status onbekend is, dan is een quarantaine periode van 8 weken noodzakelijk. Het heeft de voorkeur de dieren serologisch te monitoren voor het verlaten van de quarantaine stal. Dit is dus voordat ze aan de koppel worden toegevoegd.